

NUTRI-ALGAFOL

Ingrediente Activo: Extracto de algas marinas (Ascophyllum Nodosum, vitaminas y aminoácidos)

Grupo Químico: Bioestimulante Natural

Concentración y Formulación: 230 gr sólidos totales lts SL (Concentración soluble)

Modo de Acción: Estimulante del crecimiento y producción vegetal

Toxicidad: Se considera no tóxico

Dosis Recomendada: 4 lts. por ha

CONTENIDO: **10 litros**
FECHA DE VENCIMIENTO: **No posee**
Origen: **INDUSTRIA ARGENTINA**

NUTRITERRA S.A.

Bonduel s/n Lote 11 – Parque Industrial de Chimbos, SAN JUAN
Tel.: (0264) 426 1810 / 426 1897
Inscripta en el Reg.Nac.de Fertilizantes y Enmiendas - S.A.G.P.y A. - SENASA
con el N° C - 00723 (FRACCIONADORA)

RECOMENDACIONES DE USO	
Dosis general al follaje: 250 cc/100 L de agua	
CULTIVO	APLICACIONES
Viñas y Parrales	3 a 5 aplicaciones desde brotes de 20 a 30 cm cada 20 a 30 días, hasta pinta. En caso de ser necesario realice 1 aplicación adicional en post-cosecha. Primera aplicación 2,5 L/ha, las restantes 3,5 - 4,0 L/ha.
Pomáceas y Carozos	3 a 5 aplicaciones desde prefloración, inicio de floración, caída de pétalos y después de cuaja de frutos. En caso de ser necesario realice 1 aplicación adicional en post-cosecha.
Cítricos	3 a 5 aplicaciones desde prefloración cada 15 - 20 días; la última durante el desarrollo del fruto. En caso de ser necesario realice 1 aplicación adicional en post-cosecha.
Viveros y Ornamentales	3 a 4 aplicaciones desde inicio de crecimiento activo y después cada 15 días.
Tomates	Indeterminado: 3 aplicaciones al inicio de la floración de racimos 2,3 y 4. Cultivo botado: 3 aplicaciones al inicio de la segunda flor. Aplicaciones a través del riego: 3 L/ha.
Melones, Pepinos,	3 a 7 aplicaciones desde inicios de floración, cada 15 a 20 días.

Zapallos, Sandías	Aplicación a través del riego en sandía: 2 L/ha.
Lechugas, Coles, Coliflores, Apios	2 a 4 aplicaciones desde 4 - 5 hojas cada 15 a 20 días.
Porotos, Arvejas	2 aplicaciones. Prefloración y 25 días después.
Pimientos, Berenjenas	3 a 7 aplicaciones con plantas de 30 cm. de altura, cada 15 a 20 días.
Papas	Tratamiento de la semilla (tubérculos) al momento de plantar. Al follaje 3 aplicaciones desde formación de tubérculos, 15 - 20 días después y fin de floración.
Ajos, cebollas	3 aplicaciones desde los 10 cm. de altura y después cada 21 días.
Zanahorias	3 aplicaciones desde estado de tres hojas y 15 - 20 días después.
Alcachofas	4 aplicaciones, comenzando 20 días después de las plantación y cada 20 días.
Remolacha	2 aplicaciones. Al estado de 4 - 5 hojas y 20 días después.
Alfalfa	Varias aplicaciones. 20 días post-siembra y después cada 15 días en cada corte.
Césped	Aplicar al inicio del crecimiento y continuar con intervalos de 3 - 4 semanas. Adicionalmente después de períodos de estrés o alto tráfico, heladas y resiembra.