

# Tecamin Raiz®

**ENRAIZANTE A BASE DE AMINOACIDOS, MICROELEMENTOS Y EXTRACTOS DE ALGAS**

- **ELEVADO PODER ENRAIZANTE**
- **ESTIMULA EL DESARROLLO DE PELOS RADICULARES ABSORBENTES**
- **AUMENTA % GERMINACIÓN. UNIFORMIDAD EN EL DESARROLLO VEGETATIVO**
- **FAVORECE UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN POST-TRANSPLANTE**
- **APORTE DE MICROELEMENTOS**



## MODO DE EMPLEO

**TECAMIN RAIZ** se incorporará en la zona de influencia de las raíces mediante, riego por goteo, aspersión, micro-aspersión, inmersión, inyección o aplicación en banda de plantación mediante bomba de espalda o equipo de fumigación que asegure la incorporación del producto a la zona de influencia radicular. Se aconseja aplicar cuando sea necesario favorecer el desarrollo radicular, semillero, vivero ó almáximo ó período crítico del trasplante y en plantaciones establecidas después de un período de daños del sistema radicular por encharcamiento, sequía, sales, enfermedad, plagas...

## RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos Libres "L"	4,7 % p/p
Nitrógeno Total (N)	5,5 % p/p
Potasio Total (K <sub>2</sub> O)	1 % p/p
Materia Orgánica Total	22 % p/p
Fe-HEDTA	0,5 % p/p
Mn	0,3 % p/p
Zn	0,15 % p/p
Cu	0,05 % p/p
B	0,05 % p/p
Extracto de Algas	4 % p/p
pH	4,4

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	
Vid, uva de mesa	Desde siembra injerto en maceta o campo, cada 15-21 días, hasta agostamiento.	2-3 ml/L ó 3 L/Ha
	- Con el primer riego en plantación definitiva y para la recuperación del sistema radicular tras un período de daños por encharcamiento, sequía, sales, enfermedad, plagas...	3 L/Ha
Cítricos – Frutales (naranja, mandarino, lima, limón, pomelo, manzano, peral, melocotón, cerezo, albaricoque, ciruelo, olivo...)	- Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra ó repique, aplicar cada 7 días, durante su estancia en semillero, vivero o almáximo.	2-3 ml/L
	- En el trasplante	6-8 ml/árbol
	- Con el primer riego en plantación definitiva y para la recuperación del sistema radicular tras un período de daños por encharcamiento, sequía, sales, enfermedad, plagas...	3-4 L/Ha
Hortícola (cebolla, ajo, patata, zanahoria, lechuga, espinacas, acelgas, escarolas, apio, coliflor, brócoli, tomate, pimiento, pepino, calabaza, guisantes, judías, melón, sandía, frutilla, fresa, fresón, espárrago, berries, ...)	- Incorporar con el riego a los 3-5 días de la germinación, aplicar cada 7 días. Aplicar la dosis total dividida en 3-4 aplicaciones para las plantas que suponen una hectárea.	Dosis total para las plantas que suponen 1 hectárea: a) Primavera-Verano: 0,5-0,75 L/Ha b) Otoño-Invierno: 1 L/Ha
	- En el trasplante, riego o inmersión de las bandejas. Se puede combinar con cualquier insecticida, funguicida.	10 ml/L
	- Con el primer riego en plantación definitiva y para la recuperación del sistema radicular tras un período de daños por encharcamiento, sequía, sales, enfermedad, plagas...	3 L/Ha
Ornamentales, flores	- Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra ó repique, aplicar cada 7 días.	2-3 ml/L
	- En el trasplante, riego o inmersión de las bandejas o macetas. Se puede combinar con cualquier insecticida, funguicida.	5 ml/L
	- Después de cada corte, y para la recuperación del sistema radicular tras un período de daños por encharcamiento, sequía, sales, enfermedad, plagas...	3 L/Ha



**PRESENTACION:**  
**> LIQUIDA**  
**METODO DE APLICACION:**  
**> RADICULAR**

Fabricante:

Distribuidor Exclusivo Cuyo:

Calle Bonduel s/n - Lote 11  
 Parque Industrial Chimbas  
 5413 San Juan, Argentina  
 Tel/Fax: (0264) 4261810/1897  
 www.nutriterra.com - info@nutriterra.com

**NUTRI TERRA**  
 Fertilizantes Líquidos a Medida.

Pol. Ind. Fte. Musa, P. 36, N. 4  
 46450 Benifayó (Valencia) España  
 Tel: +34 963 391 184 / Fax: +34 963 269 823  
 info@agritecnofertilizantes.com  
 www.agritecnofertilizantes.com

**AgriTecnó**  
 Fertilizantes